

Formulário de Resposta aos recursos - CES S13 - Enfermeiro

Questão	Justificativa	Conclusão (Deferido ou Indeferido)	Resposta Alterada para:
TIPO 1: 36 TIPO 2: 41 TIPO 3: 45	<p>Alternativa correta Letra (E)</p> <p>O enunciado diz: De acordo com o Código de Ética da Enfermagem, são consideradas circunstâncias agravantes relacionadas a infrações e penalidades, EXCETO:"</p> <p>Ou seja, a questão não está perguntando qual é a penalidade, mas sim quais são as circunstâncias que agravam uma infração (ou seja, circunstâncias agravantes). A palavra-chave é "EXCETO", para identificar o que não é agravante.</p> <p>Categorias distintas do Código de Ética:</p> <p>Penalidade é a sanção aplicada ao profissional após a constatação da infração (advertência, suspensão, cassação, etc.).</p> <p>Circunstância agravante é um fator que agrava a infração cometida, podendo levar a uma penalidade mais severa.</p> <p>Circunstância atenuante é um fator que reduz a responsabilidade, podendo levar a uma penalidade mais branda.</p>	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO
TIPO 1: 37 TIPO 2: 36 TIPO 3: 47	<p>Alternativa correta Letra (E)</p> <p>O enunciado da questão afirma expressamente que o profissional divulgou conteúdo sigiloso, resultando em dano moral irremediável na vida do paciente, o que enquadra a conduta diretamente no que dispõe o §4º do artigo citado.</p> <p>Resolução COFEN nº 564/2017 — Art. 111:</p> <p>§ 3º – São consideradas infrações graves as que provoquem prejuízo significativo, exposição indevida da intimidade da pessoa, entre outras consequências.</p> <p>§ 4º – São consideradas gravíssimas as que resultem em:</p> <p>Morte, Debilidade permanente, Dano moral irremediável.</p> <p>Assim, o dano moral irremediável, por si só, já é suficiente para caracterizar a infração como gravíssima, não sendo necessária a ocorrência simultânea de outras consequências como morte ou</p>	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO

	<p>debilidade.</p> <p>O enunciado da questão afirma expressamente que o profissional divulgou conteúdo sigiloso, resultando em dano moral irremediável na vida do paciente, o que enquadra a conduta diretamente no que dispõe o §4º do artigo citado.</p>		
TIPO 1: 39 TIPO 2: 46 TIPO 3: 48	<p>Alternativa correta letra (A)</p> <p>A cirurgia paliativa é aquela realizada com o objetivo de aliviar sintomas, reduzir desconfortos ou melhorar a qualidade de vida do paciente, sem necessariamente curar a doença. Esse tipo de procedimento é comum em casos de doenças crônicas ou avançadas, como o câncer em estágio terminal, onde não há mais possibilidade de cura, mas onde é possível proporcionar melhoras funcionais ou redução de dor.</p> <p>A cirurgia paliativa não remove completamente a causa da doença, mas atua nos efeitos que ela gera sobre o organismo.</p> <p>(B) Radical – Refere-se a uma cirurgia extensa e definitiva, geralmente com intenção curativa, como a remoção completa de um tumor com margens de segurança.</p> <p>Exemplo: mastectomia radical.</p> <p>(C) Diagnóstica – Visa obter informações para confirmar um diagnóstico, como uma biópsia.</p> <p>Exemplo: laparotomia para investigar uma massa abdominal.</p> <p>(D) Curativa – Realizada com o objetivo de eliminar a doença, promovendo a cura total.</p> <p>Exemplo: apendicectomia para tratar apendicite aguda.</p> <p>(E) Exploratória – Utilizada quando não há diagnóstico preciso e é necessário investigar a cavidade (geralmente abdominal) para identificar a causa dos sintomas.</p> <p>Exemplo: cirurgia exploratória por dor abdominal de origem desconhecida.</p>	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO
TIPO 1: 40 TIPO 2: 39 TIPO 3: 37	<p>Nenhuma das alternativas representa com exatidão o conceito técnico de cirurgia de urgência.</p>	DEFERIDO	QUESTÃO ANULADA
TIPO 1: 41 TIPO 2: 48 TIPO 3: 44	<p>A alternativa correta é:</p> <p>(C) Ingestão recente, geralmente <1-2 horas de substância tóxica potencialmente letal.</p> <p>Justificativa:</p>	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO

	<p>A lavagem gástrica é um procedimento que visa remover o conteúdo do estômago para evitar a absorção de substâncias tóxicas após uma intoxicação aguda.</p> <p>Condições para indicação da lavagem gástrica:</p> <p>Tempo da ingestão: Deve ser feita em casos de ingestão recente, geralmente em até 1 a 2 horas, para que haja benefício na remoção da substância antes da absorção sistêmica.</p> <p>Tipo de substância: Indicado para substâncias potencialmente letais, em que o risco da intoxicação grave justifique o procedimento.</p> <p>Estado do paciente: O paciente deve estar consciente ou ter via aérea protegida (intubação) para evitar aspiração durante o procedimento.</p>		
<p>TIPO 1: 42</p> <p>TIPO 2: 50</p> <p>TIPO 3: 41</p>	<p>A alternativa correta é: (A) aborto evitável.</p> <p>A descrição apresentada é característica do aborto evitável, também chamado de aborto ameaçado.</p> <p>O útero está compatível com a idade gestacional e o colo do útero está fechado (ímpervio).</p> <p>Sangramento vaginal discreto ou moderado pode ocorrer, acompanhado de dor tipo cólica.</p> <p>O ovo (embrião/feto) ainda está íntegro, ou seja, não houve expulsão do conteúdo uterino.</p> <p>Esse quadro indica uma ameaça de aborto, que pode evoluir para um aborto consumado ou ser interrompido com tratamento adequado, sendo possível a manutenção da gestação.</p> <p>(B) aborto completo: caracteriza-se pela expulsão total do conteúdo uterino, com cessação do sangramento e fechamento do colo uterino.</p> <p>(C) aborto incompleto: caracteriza-se pela expulsão parcial do conteúdo uterino, com sangramento persistente e colo uterino ainda dilatado.</p> <p>(D) aborto retido: ocorre quando há morte embrionária ou fetal, mas o conteúdo permanece no útero, com colo uterino fechado e ausência de sangramento intenso.</p> <p>(E) aborto séptico: é o aborto acompanhado de infecção uterina, com sinais de infecção como febre, dor intensa, mau cheiro e sangramento.</p>	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO
<p>TIPO 1: 44</p> <p>TIPO 2: 47</p> <p>TIPO 3: 43</p>	<p>A alternativa correta é:</p> <p>(D) o DIU pode ser opção para a mulher na fase de amamentação e pode ser inserido imediatamente após o parto.</p>	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO

	<p>*O DIU (Dispositivo Intrauterino) é considerado um método contraceptivo seguro e eficaz para mulheres que estão amamentando.</p> <p>*A inserção do DIU pode ser feita imediatamente após o parto, seja no período pós-parto imediato ou nas primeiras semanas, sem interferir na amamentação.</p> <p>*A OMS e protocolos clínicos recomendam o uso do DIU como método contraceptivo de longa duração, que não afeta a produção nem a qualidade do leite materno.</p> <p>(A) Errada — A associação de amenorreia com lactação exclusiva e livre demanda tem alta eficácia como método contraceptivo, desde que obedecidos critérios específicos (método de amenorreia lactacional - MAL). A eficácia é alta nos primeiros seis meses, não apenas três, e até a menstruação voltar.</p> <p>(B) Errada — A mulher que deixa a amamentação exclusiva para parcial aumenta o risco de gravidez, mas a recomendação de iniciar método contraceptivo não é restrita a 15 dias após o parto, e sim a partir do momento que houver risco aumentado, independente desse período.</p> <p>(C) Errada — Métodos comportamentais (temperatura basal, Billings) não são indicados como primeira opção no puerpério devido à sua baixa eficácia e dificuldade de aplicação no pós-parto.</p> <p>(E) Errada — O anticoncepcional oral combinado (contendo estrogênio) não é recomendado para mulheres que estão amamentando pois pode reduzir a produção e qualidade do leite materno.</p>		
TIPO 1: 47 TIPO 2: 43 TIPO 3: 40	<p>A alternativa correta é: (B) +2°C a +8°C e -25°C a -15°C.</p> <p>De acordo com o Manual de Rede de Frio do Programa Nacional de Imunização (PNI) - 2017, os imunobiológicos devem ser armazenados conforme as seguintes faixas de temperatura:</p> <p>Câmaras frias positivas (refrigeração): entre +2°C e +8°C. Essa faixa é ideal para vacinas e outros imunobiológicos que precisam ser mantidos refrigerados sem congelar, para preservar sua estabilidade e eficácia.</p> <p>Câmaras frias negativas (congelamento): entre -25°C e -15°C. Essa faixa é usada para imunobiológicos que necessitam ser congelados para manter suas propriedades.</p> <p>(A) +4°C a +8°C e -25°C a -15°C:</p> <p>A faixa positiva começa em +4°C, o que não está correto, pois o ideal inicia em +2°C.</p>	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO

	<p>(B) +2°C a +8°C e -25°C a -15°C: Está correta conforme o manual do PNI.</p> <p>(C) +6°C a +12°C e -30°C a -15°C: As temperaturas positivas estão acima do recomendado e a negativa começa em -30°C, que é mais baixa que o padrão.</p> <p>(D) +2°C a +8°C e -15°C a -05°C: A faixa negativa está incorreta; o congelamento é entre -25°C e -15°C, não -15°C a -5°C.</p> <p>(E) +4°C a +8°C e -35°C a -25°C: A faixa negativa está muito fria, e a positiva começa em +4°C, incorreta.</p>		
TIPO 1: 48 TIPO 2: 44 TIPO 3: 39	<p>Alternativa correta letra (D)</p> <p>Síndromes e manifestações clínicas:</p> <p>1.Úlcera anogenital: Cancróide: úlcera dolorosa na região genital. Herpes genital: úlceras dolorosas múltiplas. Sífilis: úlcera indolor (cancro duro).</p> <p>2. Corrimento uretral/vaginal: Gonorreia: corrimento uretral/vaginal purulento. Tricomoníase: corrimento vaginal, geralmente amarelo-esverdeado.</p> <p>3.Verruga anogenital: Condiloma Acuminado: verrugas anogenitais causadas pelo HPV.</p> <p>Analisando cada item da lista para a sequência:</p> <p>Cancróide: úlcera anogenital - 1 Herpes genital: úlcera anogenital - 1 Sífilis: úlcera anogenital - 1 Gonorreia: corrimento uretral/vaginal - 2 Condiloma Acuminado: verruga anogenital - 3 Tricomoníase: corrimento vaginal - 2</p> <p>Portanto, a sequência correta é: 1 – 1 – 1 – 2 – 3 – 2</p>	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO
TIPO 1: 49 TIPO 2: 42 TIPO 3: 36	<p>A alternativa correta é:</p> <p>(C) A paciente tem direito a acompanhante maior de idade durante todo o atendimento, inclusive em consultas e exames íntimos.</p> <p>O Art. 19-J da Lei nº 8.080/1990 (Lei Orgânica da Saúde), alterado pela Lei nº 11.108/2005, garante que:</p> <p>"A parturiente tem direito à presença de um acompanhante durante todo</p>	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO

	<p>o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, devendo o serviço de saúde assegurar as condições para tal."</p> <p>Além disso, normas e diretrizes do Ministério da Saúde e da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) garantem o direito da mulher de ter um acompanhante maior de idade durante todos os atendimentos de saúde, inclusive em consultas e exames que envolvam contato íntimo.</p> <p>Isso visa à proteção da dignidade da paciente e à garantia de um atendimento humanizado.</p> <p>(A) Incorreta: Não é exigido formulário prévio com 24 horas de antecedência. O direito ao acompanhante é imediato e independe de burocracia prévia.</p> <p>(B) Parcialmente verdadeira, mas incompleta e subjetiva: embora o acompanhante possa ser retirado em caso de comportamento inadequado, isso não invalida o direito geral garantido por lei. Não pode ser interpretado como regra geral.</p> <p>(D) Incorreta: o direito não se restringe ao parto. Também se aplica a consultas, exames e outros procedimentos.</p> <p>(E) Incorreta: não há exigência de gestação de alto risco nem autorização médica para garantir o direito ao acompanhante.</p>		
TIPO 1: 50 TIPO 2: 40 TIPO 3: 38	<p>A alternativa correta é:</p> <p>(E) médico, enfermeiro, auxiliar e/ou técnico de enfermagem, agente comunitário de saúde.</p> <p>De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), aprovada pela Portaria nº 2.436/2017 do Ministério da Saúde, a composição mínima obrigatória de uma Equipe de Saúde da Família (ESF) é:</p> <p>1 médico generalista (preferencialmente com formação em Medicina de Família e Comunidade);</p> <p>1 enfermeiro generalista;</p> <p>1 auxiliar ou técnico de enfermagem;</p> <p>agentes comunitários de saúde (ACS) em número suficiente para cobrir 100% da população adscrita.</p> <p>Análise das alternativas:</p> <p>(A) Incorreta: psicólogo não é obrigatório na composição mínima da ESF.</p> <p>(B) Incorreta: agente de combate às endemias não faz parte da equipe mínima da ESF, mas sim de equipes de vigilância em saúde.</p>	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO

	<p>(C) Incorreta: cirurgião-dentista integra a Equipe de Saúde Bucal (ESB), que pode atuar junto à ESF, mas não é componente mínimo obrigatório da ESF.</p> <p>(D) Incorreta: farmacêutico também não integra a equipe mínima da ESF — pode estar presente em unidades com farmácia, mas não é exigido.</p> <p>(E) Correta: lista todos os profissionais obrigatórios segundo a legislação vigente.</p>		
--	---	--	--